

農業技能実習評価試験（上級）学科試験は、過去に出題された試験問題の中から、その一部を公開しています。問題は、正誤式と四択式があります。

(1) 作業中、雷や雷雨にあった時は、速やかに木の下に避難します。

かいとうらん  
解答欄

(2) ウメは成熟すると軟化が起こるので、未熟果を収穫します。

かいとうらん  
解答欄

(3) 日本人の生鮮果実の消費量は、欧米に比べて低いです。

かいとうらん  
解答欄

(4) ブドウは、受粉樹が必要です。

かいとうらん  
解答欄

(5) キウイフルーツには雄木と雌木があり、雄木には果実がなりません。

かいとうらん  
解答欄

(6) カキは、自家不和合性品種が多いです。

かいとうらん  
解答欄

(7) 間引きせん定は、花芽形成を悪くします。

かいとうらん  
解答欄

(8) ブルーベリーの生育には、強酸性土壌が適しています。

かいとうらん  
解答欄

(9) オウトウ、リンゴで訪花昆虫として飼育されているハチは、スズメバチです。

かいとうらん  
解答欄

(10) クリの実はイガに包まれていて、実とイガを合わせてきゅう果と呼びます。

かいとうらん  
解答欄

(11) リンゴのわい化栽培さいばい りてんの利点として、最も適切もっと てきせつなものを選んでください。えら

- ① 耐寒性たいかんせい、耐水性たいすいせいが向上こうじょうします。
- ② 根に寄生する病害虫びょうがいちゅう ひがい けいげんの被害を軽減けいげんします。
- ③ 生育せいいくがおう盛せいになり、樹冠じゅかんの拡大かくだいが早はやまります。
- ④ 早期そうきの成園化せいえんかと作業効率さぎょうこうりつの向上こうじょうが図はかれます。

かいとうらん  
解答欄

(12) 次の果樹つぎ かじゅのうち、受粉樹じゅふんじゅ ひつようが必要なえらものを選んでください。

- ① イチジク「栴井ますいドーフィン」
- ② ブドウ「シャインマスカット」
- ③ カキ「平核無ひらたねなし」
- ④ リンゴ「ふじ」

かいとうらん  
解答欄

(13) 花床かしょう（花托かたく）が肥大ひだいして食用部分しょくようぶぶんとなる果樹かじゅとして、最も適切もっと てきせつなものを選んでください。えら

- ① リンゴ
- ② ブドウ
- ③ モモ
- ④ クリ

かいとうらん  
解答欄

(14) 摘果で残す果実について、最も適切なものを選んでください。

① 生理落果が終わる前に、予備摘果を終わらせます。

② 予備摘果では、小さい果実を残します。

③ 予備摘果では、やや多めに果実を残します。

④ 本摘果（仕上げ摘果）では、小さい果実を残します。

かいとうらん  
解答欄

(15) 日本での落葉果樹の花芽分化開始期として、最も適切なものを選んでください。

① 冬の休眠期間中。

② 前年の落葉の頃から開始。

③ 開花直前の3月頃から開始。

④ 枝葉の生育が盛んな、前年の初夏6月～7月頃から開始。

かいとうらん  
解答欄

(16) 果物の糖度が高くなりやすい条件として、最も適切なものを選んでください。

① 湿度が高く、土壌の水分が豊富です。

② 日照時間が十分で、光合成が活発です。

③ 気温が低く、果実の生育が遅れています。

④ 曇りの日が多く、徒長ぎみに生育しています。

かいとうらん  
解答欄

(17) ナシの<sup>しゅうかくてつき</sup>収穫<sup>はんだん</sup>適期を判断するために使う<sup>つか</sup>器具<sup>きぐ</sup>として、<sup>もっと</sup>最も<sup>できせつ</sup>適切な  
ものを<sup>えら</sup>選んでください。

①ノギス

<sup>しょくみけい</sup>  
②食味計

<sup>とうどけい</sup>  
③糖度計

<sup>だい</sup>  
④台ばかり

かいとうらん 解答欄