

農業技能実習評価試験（上級）学科試験は、過去に出題された試験問題の中から、その一部を公開しています。問題は、正誤式と四択式があります。

(1) ^{たいせき おお} 体積が大きく、^{ひ か し ぼ う おお せい と ん} 皮下脂肪の多い成豚は、
^{あ つ よ わ} 暑さに弱いです。

かいとうらん
解答欄

(2) ^{はい じ しゃ う ん て ん ぎ の う こ う し ゅ う し ゅ う り よ う} 配餌車は、運転技能講習を修了していないと
^{う ん て ん} 運転できません。

かいとうらん
解答欄

(3) 1 kgの ^{たい じ ゅ う ぞ う か よ う し り よ う り よ う し り よ う よ う き ゅ う り つ} 体重の増加に要した飼料の量を飼料要求率と
いいます。

かいとうらん
解答欄

(4) ^{こ ま ふ ん さい あ つ し ゅ く せい けい き ゅ う よ} 細かく粉砕し、圧縮成型して給与するものを
^{し り よ う} リキッド飼料といえます。

かいとうらん
解答欄

(5) ^{く ず が ら に よ う た い ひ か そ く し ん} おが屑、もみ殻はふん尿の堆肥化を促進するために
^{つ か} 使われます。

かいとうらん
解答欄

(6) 豚は、寝る場所と排せつ場所とを区別しない習性をも持っているため、豚舎の構造もそのように設計します。

かいとうらん
解答欄

(7) ワクチンは、母子を連動させて接種してはいけません。

かいとうらん
解答欄

(8) SPF豚は、特定の微生物や病原体を持たない豚をいいます。

かいとうらん
解答欄

(9) 健康な成豚の体温は、38℃くらいです。

かいとうらん
解答欄

(10) 豚の発情は夜間に始まり、平均で20時間くらい持続します。

かいとうらん
解答欄

(11) つぎ とくちょう も ぶた ひんしゅめい なん
次の特徴を持つ豚の品種名は、何ですか。

げんさん けいろ くろ しし はな お さき
「イギリス原産のミートタイプで、毛色は黒、四肢、鼻、尾の先に
はくはん も
白斑を持ちます」

- ① デュロック種
- ② ハンプシャー種
- ③ 中ヨークシャー種
- ④ バークシャー種

かいとうらん
解答欄

(12) ぶた はつじょうしゅうき もっと てきせつ えら
豚の発情周期として、最も適切なものを選んでください。

- ① 約7日
- ② 約21日
- ③ 約45日
- ④ 約100日

かいとうらん
解答欄

(13) たいじゅう ぶた なん えだにく
体重115kgの豚から、何kgの枝肉がとれますか。

もっと てきせつ えら
最も適切なものを選んでください。

- ① 35kg
- ② 55kg
- ③ 75kg
- ④ 115kg

かいとうらん
解答欄

(14) 肥育豚の飼料の栄養素として確認する項目として、最も不適切なものを選んでください。

① エネルギー

② 蛋白質

③ ビタミン

④ 繊維質

かいとうらん
解答欄

(15) 豚の病気で原虫が原因とされているものとして、最も適切なものを選んでください。

① トキソプラズマ病

② 口蹄疫

③ CSF (豚熱)

④ AD (オーエスキー病)

かいとうらん
解答欄

(16) 日本の豚の法定伝染病として、最も適切なものを選んでください。

① PED (豚流行性下痢)

② TGE (豚伝染性胃腸炎)

③ 口蹄疫

④ 豚赤痢

かいとうらん
解答欄

(17) 貧血^{ひんけつ}を防ぐ^{ふせ}ため、生後^{せいご}2～3日^{にちれい}齢^{こぶた}ごろの子豚^{とうよ}に投与^{とうよ}するものとして、
最も^{もっと}適切^{てきせつ}なものを選^{えら}んでください。

① ビタミン^{ざい}剤

② カルシウム^{ざい}剤

③ タウリン^{ざい}剤

④ 鉄^{てつざい}剤

かいとうらん 解答欄